

A PROPOS DE LA PRÉSENCE D'UNE PRÆSCUTELLA DANS LE LUTÉTIEN
DU BASSIN PARISIEN,

PAR M. RENÉ ABRARD.

M. J. Lambert a signalé dans le calcaire grossier d'Ecos ⁽¹⁾, et décrit sous le nom de *Præscutella Cossmanni* un Échinide dont il n'est pas sans intérêt de remarquer la présence dans le Lutétien du bassin parisien, où il semble d'ailleurs rarissime.

Ce genre est en effet représenté dans le bassin de la Loire-Inférieure par de nombreux exemplaires d'une autre espèce, *P. Cailliaudi* Cott., qui se trouve dès la base des dépôts éocènes, dans le calcaire d'Arthon, mais qui est surtout abondante dans les sables coquilliers de Bois-Gouët. L'existence d'une espèce du genre dès le Lutétien inférieur d'Ecos confirme l'âge lutétien des sables de Bois-Gouët où l'on rencontre en abondance *Lenita patellaris*, Échinide du calcaire grossier inférieur parisien.

M. J. Lambert fait remarquer que *P. Cossmanni* a un périprocte marginal, ce qui lui confère un caractère archaïque, mais il ne faut pas oublier que les sables de Bois-Gouët sont au sommet de la série lutétienne, tandis que le calcaire grossier d'Ecos en est à la base, et que d'autre part, il existe une espèce du Cotentin qui présente également un périprocte marginal.

(1) J. LAMBERT, Note sur quelques Échinides éocéniques des environs de Paris. (*Bull. Soc. Et. Sc. Nat. d'Elbeuf*, 12 p., 1 pl., 1910. Voir p. 6-7.)